



ਹਾਈਪੋਗਲੀਸੇਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਲਕੇ ਹਾਈਪੋਗਲੀਸੇਮੀਆ ਦਾ ਖੁਦ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹੋ -
ਹਾਈਪੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ

ਗੰਭੀਰ
ਹਾਈਪੋਗਲੀਸੇਮੀਆ ਵਿੱਚ

ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ 15 - 20 ਗ੍ਰਾਮ
ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

999 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ

ਕੀ ਗਲੂਕਾਜਨ ਹਾਈਪੋ ਕਿੱਟ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?
ਕੀ ਗਲੂਕਾਜਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਲੂਕਾਜਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ

ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ

ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ

ਗਲੂਕਾਜਨ ਦੇਣਾ
ਗਲੂਕਾਜਨ 10 -
15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਸ ਦੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹੋ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਹਾਂ

4 -5 ਵੱਡੇ ਜੈਲੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਾਂ
200 ਮਿਲੀ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਜੂਸ ਜਾਂ
2 ਟਿਊਬ ਗਲੂਕੋਜੈਲ ਜਾਂ
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ 4 - 6 ਗੋਲੀਆਂ

10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

<3.5 mmol/l
ਤੋਂ ਘੱਟ BG

>3.5 mmol/l ਤੋਂ ਵੱਧ BG

ਉਪਰੋਕਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ

20 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਧਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ,
ਬਿਸਕੁਟ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ

ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼
'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ BG ਨਿਯਮਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ 40
ਗ੍ਰਾਮ ਮਧਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
20ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ (ਗਾੜ੍ਹਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਟੇ ਟੇਸਟ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ 24
ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵੋ।
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।